

科名	脳外科	脳外-5
対象疾患名	悪性神経膠腫	
プロトコール名	デモダール(再発)	

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	2	3	4	5	...	28
1	点滴注	メイン	生食	250mL	ルートキープ	↓	↓	↓	↓	↓		
2	点滴注	側管	グラニセトロンバッグ デキサート注	1mg 3.3~13.2mg	30分かけて	↓	↓	↓	↓	↓		
3	点滴注	側管	デモダール注 生食	150、200mg/m ² 250mL	注射用水で溶解 必ず90分で	↓	↓	↓	↓	↓		
2'	内服	ナゼアOD錠	デモダール注投与30分前に									

★1クール=28日

～ MEMO ～

- ・催吐レベル3(30～90%)
- ・制吐剤(ナゼアOD)を内服する場合はデモダール注投与30分前に投与
- ・5日間連日投与、23日間休薬
- ・本剤の投与開始にあたっては次の条件をすべて満たすこと。
 - ① 好中球数の最低値が1, 500/mm²以上
 - ② 血小板数の最低値が100, 000/mm²以上
- ・1クール以後、次の条件をすべて満たした場合に限り、次クールの投与量を200mg/m²/日に増量することができる。
 - ① 好中球数の最低値が1, 500/mm²以上
 - ② 血小板数の最低値が100, 000/mm²以上
- ・各クールの期間中、血液検査を適切な時期に実施し、好中球数及び血小板数の最低値に基づいて次クールでの用量調整の必要性について判断すること。
- ・調製方法
 - ① 1バイアルあたり41mLの注射用水で溶解
 - ② 患者の体表面積から換算した投与量を生食で希釈し、最終投与量を250mLに調製する。
 - ③ 調製後は、原則14時間以内に投与を終了すること