

科名 耳鼻咽喉科 耳鼻—2(a)
 対象疾患 頭頸部癌
 プロトコール名 DOC+CDDP+5FU

Rp	形態	ルート	薬剤名	投与量	時刻・コメント	1	2	3	4	5	...	22
1	点滴注	メイン	生理食塩液 5%ブドウ糖 KCLキット	1000mL 1000mL 10mL	22:00～10:00 ※アリメバッグ	↓						
2	点滴注	側管	アロキシバッグ デキサート注 又は	0.75mg 3.3～13.2～16.5mg	9:00～ 30分かけて	↓						
3	点滴注	側管	グラニセトロンバッグ デキサート注	3mg 3.3～13.2～16.5mg	9:00～ 30分かけて							
4	点滴注	側管	ネオレスタール注 生理食塩液	10mg 50mL	9:30～ 30分かけて	↓						
5	点滴注	側管	デキサート注 生理食塩液	6.6mg 50mL	9:30～ 30分かけて			↓	↓	↓	↓	
6	点滴注	側管	ドセタキセル 生理食塩液	75mg/m ² 250mL	10:00～12:00 壊死性抗がん剤	↓						
7	点滴注	側管	シスプラチン注 生理食塩液	75mg/m ² 250mL	12:00～14:00	↓						
8	点滴注	メイン	5FU 生理食塩液 5%ブドウ糖 KCLキット	375mg/m ² 1000mL 1000mL 10mL	10:00～22:00 ※アリメバッグ	↓						
9	点滴注	メイン	5FU 生理食塩液 5%ブドウ糖 KCLキット	375mg/m ² 1000mL 1000mL 10mL	22:00～10:00 ※アリメバッグ	↓						
10	点滴注	メイン	5FU 生理食塩液 5%ブドウ糖 KCLキット	750mg/m ² 1000mL 1000mL 10mL	10:00～10:00 ※アリメバッグ			↓	↓	↓	↓	
11	点滴注	側管	マンニトールS	300mL	14:00～16:00	↓						

1クール＝22日(day1はハイドレーション)

～MEMO～

催吐レベル4(90%以上)

イメンドカプセルを内服する。(day2は9時30分に125mg、day3、4は午前中に80mg)

<ドセタキセル>

調製時、完全に溶解、混和したことが確認できるまで緩やかに混和操作を繰り返すこと。

初回、二回目まではアレルギーの出現に注意。

投与開始から10分間はベッドサイドを離れない。

薬剤の特徴により1mL=20滴とならないため滴下数を1.5倍にすること。
 (1hrで滴下する場合126滴/分)