

科名 耳鼻咽喉科 耳鼻-2(b)
 対象疾患 頭頸部癌
 プロトコール名 DOC+CDDP+5FU(プロイメンド併用)

Rp	形態	ルート	薬剤名	投与量	時刻・コメント	1	2	3	4	5	6	...	22
1	点滴注	メイン	生理食塩液 5%ブドウ糖 KCLキット	1000mL 1000mL 10mL	22:00～10:00 ※アリメバッグ [®]	↓							
2	点滴注	側管	プロイメンド [®] 生食	150mg 100mL	8:30～ 30分かけて	↓							
3	点滴注	側管	アロキシバッグ [®] デキサート注 又は	0.75mg 9.9mg	9:00～ 30分かけて	↓							
4	点滴注	側管	グラニセトロンバッグ [®] デキサート注	3mg 9.9mg	9:00～ 30分かけて	↓							
5	点滴注	側管	ネオレスタール注 [®] 生理食塩液	10mg 50mL	9:30～ 30分かけて	↓							
6	点滴注	側管	デキサート注 [®] 生理食塩液	3.3mg 50mL	9:30～ 30分かけて			↓					
7	点滴注	側管	デキサート注 [®] 生理食塩液	6.6mg 50mL	9:30～ 30分かけて				↓	↓	↓		
8	点滴注	側管	ドセタキセル [®] 生理食塩液	75mg/m ² 250mL	10:00～12:00	↓							
9	点滴注	側管	シスプラチン注 [®] 生理食塩液	75mg/m ² 250mL	12:00～14:00	↓							
10	点滴注	メイン	5FU 生理食塩液 5%ブドウ糖 KCLキット	375mg/m ² 1000mL 1000mL 10mL	10:00～22:00 ※アリメバッグ [®]	↓							
11	点滴注	メイン	5FU 生理食塩液 5%ブドウ糖 KCLキット	375mg/m ² 1000mL 1000mL 10mL	22:00～10:00 ※アリメバッグ [®]	↓							
12	点滴注	メイン	5FU 生理食塩液 5%ブドウ糖 KCLキット	750mg/m ² 1000mL 1000mL 10mL	10:00～10:00 ※アリメバッグ [®]			↓	↓	↓	↓		
13	点滴注	側管	マンニトールS	300mL	14:00～16:00	↓							

1クール＝22日(day1はハイドレーション)

～MEMO～

day1はハイドレーション

催吐レベル4(90%以上)

<ドセタキセル>

調製時、完全に溶解、混和したことが確認できるまで緩やかに混和操作を繰り返すこと。

アレルギー発症時期:初回、2回目

投与開始から10分間はベッドサイドを離れない。

薬剤の特徴により1mL=20滴とならないため滴下数を1.5倍にする。
 (1hrで滴下する場合126滴/分)