

科名 耳鼻科  
 対象疾患名 頭頸部がん  
 プロトコール名 Cmab+FP(初回)

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	2	3	4	5	6	...	9	...	16	...	22
1	点滴注	メイン	フィジオ140	500mL	22:00～翌4:00	↓											
2	点滴注	側管①	5%ブドウ糖	500mL	22:00～翌4:00	↓											
3	点滴注	メイン	フィジオ140	500mL	4:00～10:00		↓										
4	点滴注	側管①	5%ブドウ糖	500mL	4:00～10:00		↓										
5	点滴注	メイン	生食	500mL	10:00～16:00		↓										
6	点滴注	側管①	プロイメンド 生食	150mg 100mL	10:00～10:30		↓										
7	点滴注	側管①	グラニセトンバッグ デキサート	1mg 9.9mg	10:30～11:00		↓										
8	点滴注	側管①	又は アロキシバッグ デキサート	0.75mg 9.9mg	10:30～11:00												
9	点滴注	側管①	アービタックス 生食	400mg/㎡ 250mL	11:00～13:00		↓										
10	点滴注	側管①	シスプラチン 生食	100mg/㎡ 250mL	14:00～16:00		↓										
11	点滴注	側管②	マンニトールS	300mL	14:00～16:00		↓										
12	点滴注	メイン	フィジオ140	500mL	16:00～22:00		↓										
13	点滴注	側管①	5FU 5%ブドウ糖	250mg/㎡ 500mL	16:00～22:00		↓										
14	点滴注	メイン	フィジオ140	500mL	22:00～翌4:00		↓										
15	点滴注	側管①	5FU 5%ブドウ糖	500mg/㎡ 500mL	22:00～翌10:00		↓										
16	点滴注	メイン	フィジオ140	500mL	4:00～10:00			↓									
17	点滴注	メイン	フィジオ140	500mL	10:00～16:00			↓									
18	点滴注	側管①	5FU 生食	250mg/㎡ 500mL	10:00～16:00			↓									
19	点滴注	側管②	デキサート 生食	6.6mg 50mL	10:00～10:30			↓									
20	点滴注	メイン	フィジオ140	500mL	16:00～22:00			↓	↓	↓							
21	点滴注	メイン	生食	500mL	22:00～翌4:00			↓	↓	↓							
22	点滴注	メイン	フィジオ140	500mL	4:00～10:00				↓	↓	↓						
23	点滴注	メイン	生食	500mL	10:00～16:00					↓	↓	↓					
24	点滴注	側管①	5FU 生食	1000mg/㎡ 250mL	16:00～翌16:00			↓	↓	↓							
25	点滴注	側管②	デキサート 生食	6.6mg 50mL	10:00～10:30				↓	↓							
26	点滴注	メイン	生食	500mL	ルートキープ 残破薬可								↓			↓	
27	点滴注	側管①	デキサート クロールトリメトン 生食	6.6mg 10mg 50mL	30分かけて								↓			↓	
28	点滴注	側管①	アービタックス 生食	250mg/㎡ 250mL	医師の指示通り								↓			↓	

★1クール＝22日(day1はハイドレーション)

～MEMO～

催吐レベル4(90%以上)

〈アービタックス〉

アービタックスの初回投与量は400mg/㎡を2時間かけて、2回目以降は250mg/㎡を1時間かけて点滴静注する。

アービタックス投与中及び投与終了後少なくとも1時間はバイタルサイン等をモニタリングする。

アービタックス投与前後は生食でフラッシュすること。

アービタックス終了後、1時間ルートキープにて休薬する。