

科名 耳鼻科

対象疾患名 頭頸部癌

プロトコール名 Cmab+CBDCA+FU(初回)(プロイメンド併用)

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	2	3	4	...	8	...	15	...	21
1	点滴注	メイン	生食	500mL	ルートキープ 残破棄可	↓	↓	↓	↓		↓		↓		
2	点滴注	側管	プロイメンド	150mg	30分かけて	↓									
			生食	100mL											
3	点滴注	側管	アロキシ	0.75mg	30分かけて	↓									
			デキサート	4.95mg											
			ネオレスタール	10mg											
4	点滴注	側管	アービタックス	400mg/m ²	2時間かけて	↓									
			生食	250mL											
5	点滴注	側管	生食	50mL	30分かけて						↓		↓		
			デキサート	6.6mg											
			ネオレスタール	10mg											
6	点滴注	側管	アービタックス	250mg/m ²	2時間かけて						↓		↓		
			生食	250mL											
1時間休薬ルートキープにて休薬															
7	点滴注	側管	カルボプラチン	AUC5	1時間かけて	↓									
			生食	250mL											
8	点滴注	側管	フルオロウラシル	1000mg/m ²	24時間かけて	↓	↓	↓	↓						
			生食	500mL											

★1クール＝21日

～MEMO～

催吐レベル3(30%以上90%未満)

day2-4にデカトロン錠を朝,昼食後に4mg/回

6コースまで

<アービタックス>

アービタックスの初回投与量は400mg/m²を2時間かけて、2回目以降は250mg/m²を

1時間かけて点滴静注する。

アービタックス投与中及び投与終了後少なくとも1時間はバイタルサイン等をモニタリングする。

アービタックス投与前後は生食でフラッシュすること。

アービタックス終了後、1時間ルートキープにて休薬する。

<カルボプラチン>

投与量計算:AUC5=5x(Ccr+25)コッククロフト式

アレルギー好発時期:8回目以降