

科名 耳鼻科

対象疾患名 進行頭頸部癌

プロトコール名 weekly CDDP+RT(頭頸部癌)

| Rp | 形態  | ルート | 薬品名                | 投与量                          | 時刻・コメント               | 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 7 |
|----|-----|-----|--------------------|------------------------------|-----------------------|---|---|---|---|-----|---|
| 1  | 点滴注 | メイン | ソルデム3A<br>硫酸マグネシウム | 200mL<br>10mL                | 1時間で投与<br>10:00～11:00 | ↓ |   |   |   |     |   |
| 2  | 点滴注 | メイン | 生理食塩液              | 500mL                        | 11:00～14:00           | ↓ |   |   |   |     |   |
| 3  | 点滴注 | 側管① | プロイメンド<br>生理食塩液    | 150mg<br>100mL               | 30分かけて<br>11:00～11:30 | ↓ |   |   |   |     |   |
| 4  | 点滴注 | 側管② | アロキシバッグ<br>デキサート   | 0.75mg<br>9.9mg              | 30分で投与<br>11:30～12:00 | ↓ |   |   |   |     |   |
| 5  | 静注  | 側管③ | ラシックス              | 10mg                         | 12:00                 | ↓ |   |   |   |     |   |
| 6  | 点滴注 | 側管④ | シスプラチン<br>生理食塩液    | 40mg/m <sup>2</sup><br>500mL | ラシックス投与後開始<br>2時間かけて  | ↓ |   |   |   |     |   |
| 7  | 点滴注 | メイン | ソルアセトF             | 500mL                        | 3時間かけて<br>14:00～17:00 | ↓ |   |   |   |     |   |
| 8  | 点滴注 | メイン | ソルデム3A             | 500mL                        | 3時間かけて<br>17:00～20:00 | ↓ |   |   |   |     |   |
| 9  | 点滴注 | メイン | ソルアセトF             | 500mL                        | 20:00～0:00            | ↓ |   |   |   |     |   |
| 10 | 点滴注 | メイン | ソルデム3A             | 500mL                        | 0:00～6:00             |   | ↓ |   |   |     |   |
| 11 | 点滴注 | メイン | ソルアセトF             | 500mL                        | 6:00～12:00            |   | ↓ |   |   |     |   |
| 12 | 点滴注 | 側管  | 生理食塩液<br>デキサート     | 50mL<br>6.6mg                | 10:00～<br>30分かけて      |   | ↓ |   |   |     |   |
| 13 | 点滴注 | メイン | ソルデム3A             | 500mL                        | 12:00～18:00           |   | ↓ |   |   |     |   |
| 14 | 点滴注 | メイン | ソルアセトF             | 500mL                        | 18:00～0:00            |   | ↓ |   |   |     |   |
| 15 | 点滴注 | メイン | ソルデム3A             | 500mL                        | 0:00～6:00             |   |   | ↓ |   |     |   |
| 16 | 点滴注 | メイン | ソルデム3A<br>プリンペラン   | 500mL<br>10mg                | 6:00～14:00            |   |   | ↓ |   |     |   |
| 17 | 点滴注 | 側管  | 生理食塩液<br>デキサート     | 50mL<br>6.6mg                | 9:00～<br>30分かけて       |   |   | ↓ |   |     |   |
| 18 | 点滴注 | メイン | ソルデム3A             | 500mL                        | 14:00～22:00           |   |   | ↓ |   |     |   |
| 19 | 点滴注 | メイン | ソルデム3A             | 500mL                        | 22:00～6:00            |   |   | ↓ |   |     |   |
| 20 | 点滴注 | メイン | ソルデム3A             | 500mL                        | 6:00～10:00            |   |   |   | ↓ |     |   |
| 21 | 点滴注 | 側管  | 生理食塩液<br>デキサート     | 50mL<br>6.6mg                | 9:00～<br>30分かけて       |   |   |   | ↓ |     |   |

★1クール＝7日

～MEMO～

催吐レベル4(90%以上)

シスプラチン投与後放射線照射

7クールまで

CDDP投与量の減量基準

CCr $\geq$ 60は100%Dose45 $\leq$ CCr<60は75%Dose30 $\leq$ CCr<45は50%Dose

CCr&lt;30は投与中止