

科名 耳鼻咽喉科 耳鼻科4(a)
 対象疾患 頭頸部癌
 プロトコール名 DOC+CDGP+5FU

Rp	形態	ルート	薬剤名	投与量	時刻・コメント	1	2	3	4	5	...	28
1	点滴注	メイン	生理食塩液	250mL	ルートキープ 残破棄可	↓						
2	点滴注	側管	アロキシバッグ デキサート注	0.75mg 3.3～13.2～16.5mg	9:00～ 30分かけて	↓						
3	点滴注	側管	又は グラニセトロンバッグ デキサート注	1mg 3.3～13.2～16.5mg	9:00～ 30分かけて							
4	点滴注	側管	ネオレスタール注 生理食塩液	10mg 50mL	9:30～ 30分かけて	↓						
5	点滴注	側管	デキサート注 生理食塩液	6.6mg 50mL	9:30～ 30分かけて		↓	↓	↓			
6	点滴注	側管	ドセタキセル 生理食塩液	60mg/m ² 250mL	10:00～12:00 壊死性抗がん剤	↓						
7	点滴注	側管	アクブラ注 生理食塩液	100mg/m ² 500mL	12:00～14:00	↓						
8	点滴注	メイン	5FU 生理食塩液 5%ブドウ糖 KCLキット	700mg/m ² 1000mL 1000mL 10mL	10:00～10:00 ※アリメバッグ	↓						
9	点滴注	メイン	5FU 生理食塩液 5%ブドウ糖 KCLキット	700mg/m ² 500mL 500mL 10mL	10:00～10:00 ※アリメバッグ		↓	↓	↓	↓		

1クール＝28日

～MEMO～

催吐レベル3(30～90%)

イメンドカプセルを内服する。(day1は9時30分に125mg、day2, 3は午前中に80mg)

<ドセタキセル>

調製時、完全に溶解、混和したことが確認できるまで緩やかに混和操作を繰り返すこと。

初回、二回目まではアレルギーの出現に注意。

投与開始から10分間はベッドサイドを離れない。

薬剤の特徴により1mL=20滴とならないため滴下数を1.5倍にすること。

(1hrで滴下する場合126滴/分)