

科名 耳鼻咽喉科 耳鼻科4(b)

対象疾患 頭頸部癌

プロトコール名 DOC+CDGP+5FU(プロイメンド併用)

Rp	形態	ルート	薬剤名	投与量	時刻・コメント	1	2	3	4	5	...	28
1	点滴注	メイン	生理食塩液	250mL	ルートキープ 残破棄可	↓						
2	点滴注	側管	プロイメンド	150mg	8:30～	↓						
			生理食塩液	100mL	30分かけて							
3	点滴注	側管	アロキシバッグ	0.75mg	9:00～	↓						
			デキサート注	9.9mg	30分かけて							
			又は									
4	点滴注	側管	グラニセトロンバッグ	3mg	9:00～	↓						
			デキサート注	9.9mg	30分かけて							
5	点滴注	側管	ネオレスタール注	10mg	9:30～	↓						
			生理食塩液	50mL	30分かけて							
6	点滴注	側管	デキサート注	3.3mg	9:30～		↓					
			生理食塩液	50mL	30分かけて							
7	点滴注	側管	デキサート注	6.6mg	9:30～			↓	↓			
			生理食塩液	50mL	30分かけて							
8	点滴注	側管	ドセタキセル	60mg/m ²	10:00～12:00	↓						
			生理食塩液	250mL	壊死性抗がん剤							
9	点滴注	側管	アクプラ注	100mg/m ²	12:00～14:00	↓						
			生理食塩液	500mL								
10	点滴注	メイン	5FU	700mg/m ²	10:00～10:00	↓						
			生理食塩液	1000mL	※アリメバッグ							
			5%ブドウ糖	1000mL								
			KCLキット	10mL								
11	点滴注	メイン	5FU	700mg/m ²	10:00～10:00		↓	↓	↓	↓		
			生理食塩液	500mL	※アリメバッグ							
			5%ブドウ糖	500mL								
			KCLキット	10mL								

1クール＝28日

～MEMO～

催吐レベル3(30%～90%)

<ドセタキセル>

調製時、完全に溶解、混和したことが確認できるまで緩やかに混和操作を繰り返すこと。

初回、二回目まではアレルギーの出現に注意。

投与開始から10分間はベッドサイドを離れない。

薬剤の特徴により1mL=20滴とならないため滴下数を1.5倍にすること。

(1hrで滴下する場合126滴/分)