

科名 耳鼻咽喉科 耳鼻科4(b)

対象疾患 頭頸部癌

プロトコール名 DOC+CDGP+5FU(プロイメンド併用)

Rp	形態	ルート	薬剤名	投与量	時刻・コメント	1	2	3	4	5	...	28
1	点滴注	メイン	生理食塩液	250mL	ルートキープ 残破棄可	↓						
2	点滴注	側管	プロイメンド 生理食塩液	150mg 100mL	8:30～ 30分かけて	↓						
3	点滴注	側管	アロキシバッグ デキサート注 又は	0.75mg 9.9mg	9:00～ 30分かけて	↓						
4	点滴注	側管	グラニセトンバッグ デキサート注	1mg 9.9mg	9:00～ 30分かけて	↓						
5	点滴注	側管	ネオレスタール注 生理食塩液	10mg 50mL	9:30～ 30分かけて	↓						
6	点滴注	側管	デキサート注 生理食塩液	3.3mg 50mL	9:30～ 30分かけて		↓					
7	点滴注	側管	デキサート注 生理食塩液	6.6mg 50mL	9:30～ 30分かけて			↓	↓			
8	点滴注	側管	ドセタキセル 生理食塩液	60mg/m ² 250mL	10:00～12:00 壊死性抗がん剤	↓						
9	点滴注	側管	アクプラ注 生理食塩液	100mg/m ² 500mL	12:00～14:00	↓						
10	点滴注	メイン	5FU 生理食塩液 5%ブドウ糖 KCLキット	700mg/m ² 1000mL 1000mL 10mL	10:00～10:00 ※アリメバッグ	↓						
11	点滴注	メイン	5FU 生理食塩液 5%ブドウ糖 KCLキット	700mg/m ² 500mL 500mL 10mL	10:00～10:00 ※アリメバッグ		↓	↓	↓	↓		

1クール＝28日

～MEMO～

催吐レベル3(30%～90%)

<ドセタキセル>

調製時、完全に溶解、混和したことが確認できるまで緩やかに混和操作を繰り返すこと。

初回、二回目まではアレルギーの出現に注意。

投与開始から10分間はベッドサイドを離れない。

薬剤の特徴により1mL=20滴とならないため滴下数を1.5倍にすること。

(1hrで滴下する場合126滴/分)