

科名 呼吸器内科

対象疾患名 扁平上皮癌

プロトコール名 キイトルーダ+Triweekly PTX+CBDCA(呼吸器)

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	21
1	点滴注	メイン	生理食塩液	500mL	ルートキープ 残破棄可	↓		
2	点滴注	側管	アロキシバッグ デキサート注 ファモチジン注	0.75mg 3.3～19.8mg 20mg	30分かけて	↓		
3	点滴注	側管	ネオレストアル注 生理食塩液	10mg 50mL	30分かけて	↓		
4	点滴注	側管	キイトルーダ 生食	200mg/body 100mL	30分かけて 専用ルートJY-PF340P52使用 投与前後生食フラッシュ	↓		
5	点滴注	側管	パクリタキセル 生理食塩液	200mg/m ² 500mL	3時間以上かけて 専用ルートJY-PF340P52使用 ※壊死性抗がん剤	↓		
6	点滴注	側管	カルボプラチン 生理食塩液	AUC6 250mL	1時間以上かけて	↓		

★1クール=21日

～MEMO～

催吐レベル(30%～90%)
day2～3にデカドロン錠を朝、昼食後に4mg/回
4コースまで
＜パクリタキセル＞
禁忌:薬剤アレルギーの既往の多い症例,アルコール含有,アルコールアレルギーの確認要
アレルギー好発時期:初回,2回目(投与開始から10分間はベッドサイドを離れない)
PVCフリーかつフィルター付き(回路名:JY-PF340P52)を使用
薬剤特徴:1mL=20滴⇒滴下数1.6倍(90滴/分×3h)
＜カルボプラチン＞
投与量計算:AUC6=6x(Ccr+25)
アレルギー好発時期:8回目以降

＜キイトルーダ＞

本剤作用機序により、過度の免疫反応による副作用が現れることがある。発現した事象に応じた専門医と連携すること。

特に注意を要する副作用:間質性肺疾患、大腸炎、重度の下痢、肝炎、神経障害、副腎障害、重度の皮膚障害

infusion reaction、重症筋無力症、筋炎、1型糖尿病、甲状腺機能障害、腎障害、脳炎、静脈血栓症

インラインフィルター(0.2または0.22ミクロン)(回路名:JY-PF340P52)を使用し、投与前後に生食でフラッシュする。