

科名 呼吸器内科
 対象疾患名 局所進行性非小細胞肺癌
 プロトコール名 PTX+CBDCA+RT

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	...	8	...	15	...	22	...	29	...	36	...	56
1	点滴注	メイン	生食	250mL	ルートキープ 残破棄可	↓		↓		↓		↓		↓		↓		
2	点滴注	側管	グラニセロンバッグ デキサート ファモチジン 又は	1mg 9.9mg 20mg	30分かけて	↓												
3	点滴注	側管	アロキシバッグ デキサート ファモチジン 又は	0.75mg 9.9mg 20mg	30分かけて													
4	点滴注	側管	グラニセロンバッグ デキサート ファモチジン 又は	1mg 6.6mg 20mg	30分かけて			↓		↓		↓		↓		↓		
5	点滴注	側管	アロキシバッグ デキサート ファモチジン	0.75mg 6.6mg 20mg	30分かけて													
6	点滴注	側管	ネオレスタール 生食	10mg 50mL	30分かけて	↓		↓		↓		↓		↓		↓		
7	点滴注	側管	パクリタキセル 生食	40mg/m ² 250mL	60分かけて 専用ルート使用 ※壊死性抗がん剤	↓		↓		↓		↓		↓		↓		
8	点滴注	側管	カルボプラチン 生食	AUC2 250mL	60分かけて	↓		↓		↓		↓		↓		↓		

★1クール=56日

～MEMO～

催吐レベル3(30%～90%)

<パクリタキセル>

禁忌:薬剤アレルギーの既往の多い症例,アルコール含有,アルコールアレルギーの確認要

アレルギー好発時期:初回,2回目(投与開始から10分間はベッドサイドを離れない)

PVCフリーかつフィルター付き(回路名:JY-PF340P52)を使用

薬剤特徴:1mL=20滴⇒滴下数1.6倍(90滴/分×1h)

<カルボプラチン>

投与量計算:AUC2=2x(Ccr+25)

アレルギー好発時期:8回目以降