

科名 呼吸器内科
 対象疾患名 非小細胞肺癌
 プロトコール名 PEM+BEV

R p	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	2	3	4	5	...	21
1	点滴注	メイン	生食	250mL	ルートキープ 残破棄可							
2	点滴注	側管	デキサート 生食	6.6mg 50mL	30分かけて							
3	点滴注	側管	アリムタ 生食	500mg/m ² 100mL	10分かけて							
4	点滴注	側管	アバスチン 生食	15mg/kg 100mL	医師の指示通り							

1クール = 21日

～ MEMO ～

催吐レベル2(10%～30%)

<アリムタ>

NSAIDsと併用注意

副作用予防のため必ず葉酸とビタミンB12を組み合わせる。

葉酸: フォリアミン0.5mg/dayはアリムタ投与7日前～最終投与後22日目まで毎日投与。

ビタミンB12: メチコバール注500μgを2Aアリムタ投与7日前～最終投与後22日目まで9週毎(3コースごと)

<アバスチン>

3レジメン以上の化学療法歴、消化管等腹腔内炎症の合併症例使用不可

創傷治癒遅延の作用により術後28日以内の投与不可

投与速度: 初回90分, 忍容性良好であれば60分, 30分まで短縮可