

科名 呼吸器外科
 対象疾患名 非小細胞がん(非扁平上皮がん)
 プロトコール名 PEM+CBDCA(プロイメンド併用)

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1 ... 8 ... 15 ... 21
1	点滴注	メイン	生食	250mL	ルートキープ	↓
2	点滴注	側管	プロイメンド 生食	150mg 100mL	30分かけて	↓
3	点滴注	側管	グラニセトロンバッグ デキサート 又は	1mg 4.95mg	30分かけて	↓
4	点滴注	側管	アロキシバッグ デキサート	0.75mg 4.95mg	30分かけて	
5	点滴注	側管	アリムタ 生食	500mg/m ² 100mL	10分かけて	↓
6	点滴注	側管	カルボプラチン 生食	AUC5~6 250mL	1時間かけて	↓

★1クール=21日

～MEMO～

催吐レベル3(30%以上90%未満)

day2にデカドロン1回2mgを1日2回朝、昼食後に内服。(4mg/day)

day3,4にデカドロン1回4mgを1日2回朝、昼食後に内服。(8mg/day)

<アリムタ>

NSAIDsと併用注意

副作用予防のため必ず葉酸とビタミンB12を組み合わせる。

葉酸:フォリアミン0.5mg/dayはアリムタ投与7日前～最終投与後22日目まで毎日投与。

ビタミンB12:メチコバール注500μgを2Aアリムタ投与7日前～最終投与後22日目まで9週毎(3コースごと)

<カルボプラチン>

投与量計算:AUC5~6=5~6x(Ccr+25)

アレルギー好発時期:8回目以降