

科名 泌尿器科

泌尿器科25

対象疾患名 尿膜管癌

プロトコール名 S-1+CDDP療法

R p	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	...	8	9	10	11	...	35
1	点滴注	メイン	フィジオ140	500mL	6:00 ~ 8:00								
2	点滴注	メイン	ソルマルト	500mL	8:00 ~ 10:00								
3	点滴注	メイン	フィジオ140	500mL	ルートキープ シスプラチン後まで								
4	点滴注	側管	プロイメンド 生食	150mg 100mL	10:00 ~ 10:30								
5	点滴注	側管	アロキシバグ デキサート	0.75mg 9.9mg	10:30 ~ 11:00								
6	点滴注	側管	シスプラチン 生食	60mg/m ² 500mL	2時間かけて 11:00 ~ 13:00								
7	静注	側管	ラシックス注	20mg	シスプラチン後								
8	点滴注	メイン	ソルマルト	500mL	13:00 ~ 16:00								
9	点滴注	メイン	フィジオ140	500mL	16:00 ~ 19:00								
10	点滴注	メイン	ソルマルト	500mL	19:00 ~ 22:00								
11	点滴注	メイン	フィジオ140	500mL	8:00 ~ 10:00								
12	点滴注	メイン	ソルマルト	500mL	10:00 ~ 12:00								
13	点滴注	側管	デキサート 生食	3.3mg 50mL	30分かけて 10:00 ~ 10:30								
14	点滴注	側管	デキサート 生食	6.6mg 50mL	30分かけて 10:00 ~ 10:30								
15	点滴注	メイン	フィジオ140	500mL	12:00 ~ 14:00								
16	点滴注	メイン	ソルマルト	500mL	14:00 ~ 16:00								
17	点滴注	メイン	デキサート 生食	6.6mg 50mL	30分かけて 10:00 ~ 10:30								
内服 S-1を1回40mg/m ² を1日2回 d1朝食後 ~ d21夕食後投与、d22朝食後 ~ d35は休薬													

1クール = 35日

~ MEMO ~

催吐レベル4(90%以上)

S-1は21日間内服14日間休薬

S-1は1日2回内服、1回の投与量

体表面積(BSA) < 1.25m²は40mg/回1.25m² BSA < 1.5m²は50mg/回BSA 1.5m²は60mg/回