

科名 泌尿器 泌-27  
 対象疾患名 尿路上皮がん  
 プロトコール名 Triweekly TC (泌尿器)

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	...	21
1	点滴注	メイン	生理食塩液	500mL	ルートキープ 残破棄可	↓		
2	点滴注	側管	グラニセトロンバッグ	1mg	30分かけて	↓		
			デキサート注	3.3～19.8mg				
			ガモファー注	20mg				
			又は					
	点滴注	側管	アロキシバッグ	0.75mg	30分かけて	↓		
			デキサート注	3.3～19.8mg				
			ガモファー注	20mg				
3	点滴注	側管	ネオレスタール注	10mg	30分かけて	↓		
			生理食塩液	50mL				
4	点滴注	側管	パクリタキセル	175mg/m <sup>2</sup>	必ず3時間かけて 専用ルート使用	↓		
			生理食塩液	500mL	※壊死性抗がん剤			
5	点滴注	側管	カルボプラチン	AUC5	1時間以上かけて	↓		
			生理食塩液	250mL				

★1クール＝21日

～MEMO～

催吐レベル3(30%以上90%未満)

day2～4にデカドロン1回4mgを1日2回朝、昼食後に内服(8mg/day)

＜パクリタキセル＞

禁忌:薬剤アレルギーの既往の多い症例,アルコール含有,アルコールアレルギーの確認要

アレルギー好発時期:初回,2回目(投与開始から10分間はベッドサイドを離れない)

PVCフリーかつフィルター付き(回路名:JY-PF340P52)を使用

末梢静脈から投与する場合は薬剤特徴:1mL=20滴⇒滴下数1.6倍(90滴/分×1h)

＜カルボプラチン＞

投与量計算:AUC5=5x(Ccr+25)

アレルギー好発時期:8回目以降